



"永勝"

特立通微粒膠囊20毫克

Teliton M. C. 20mg

"EVEREST"

【成分】

Sennoside Calcium.....20mg
(eq. to Sennoside A & B..... 19.15mg)

【臨床藥理】

本品是緩瀉劑，其有效成分Sennoside(番瀉葉)，可以緩和通便，本品所含之配醣體傳送到結腸後變成Aglycones，能刺激腸壁的歐氏神經叢而增強蠕動，促進流體及離子於腸道中之累積而增加排便的效果，在口服後8-10小時可排出成形之軟便。

【適應症】

緩解便秘
【用法用量】成人及12歲以上，一日一次，一次1粒，於睡前服用。
醫師、藥師或藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 瀉劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥，除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

【警語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
4. 若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
5. 使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
6. 使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
7. 除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿3歲之嬰幼兒不得使用。
8. 禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者
9. 長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
10. Senna 類會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸 黏膜變黑。
11. 本藥含Senna類成分，若有皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

【賦形劑】 Sugar Spheres(25#~30#)、Talc、Hydroxy Propyl cellulose-L、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 3cps、Polyethylene Glycol 6000、Sucrose Powder、Titanium Dioxide、Food Red NO. 3(Aluminum-lake)。

【硬空膠囊】主成分：明膠。

賦形劑：純水、甘油、硫酸月桂酯鈉、食用紅色6號、食用黃色4號、二氧化鈦。

【保存方法】本藥須在室溫下保存

【包裝】2~1000顆塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

衛署藥製字第043923號



永勝藥品工業股份有限公司
嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話：05-2218686(代表號)