



"永勝"胃您好膜衣錠40公絲

Winiful F.C. Tablets 40mg "EVEREST"

"胃您好"為 Histamine H₂ 接受體拮抗劑，為 Famotidine 之製劑。本劑因拮抗胃粘膜壁細胞之 Histamine H₂ 接受體而顯示強力且持續的胃酸分泌抑制作用。本劑之安全域 (LD₅₀/ED₅₀) 廣，沒有抗男性荷爾蒙作用及藥物代謝酵素之阻害作用。臨床上，一日 40mg，分 1 次或 2 次投予，針對胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上消化道出血、逆流性食道炎以及 Zollinger-Ellison 症候群，或 1 日 20mg，分 1 次或 2 次投予，針對急性胃炎、慢性胃炎之急性增惡期產生之胃粘膜炎變，確認其有高的有效性。

【成分】

"胃您好"膜衣錠，為一錠中含有 Famotidine 40mg 的橘黃色膜衣錠。

【適應症】

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化道出血 (消化性潰瘍、急性 stress 潰瘍、出血性胃炎而引起的)、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群。

【用法用量】

通常成人 Famotidine 1 日 40mg，分一次或二次投予 (早餐後、晚餐後或睡覺前) 經口投予。依年齡、症狀適宜增減之。但上部消化道出血時，通常以注射劑開始治療，待能口服後，始改成經口投予。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 治療時，應充分觀察其經過，依病狀限用於治療上最小劑量；若本劑未見效果時，請改用其他療法。另外，血液像、肝機能、腎機能等須注意。
- 下列患者，請慎重投予
 - (1) 有藥物過敏症之既往歷的患者
 - (2) 有腎障礙之患者 (因為血中濃度持續，所以需減少投予量或將投予間隔延長。)
 - (3) 有肝障礙之患者 (恐怕會使症狀惡化。)
 - (4) 高齡者 (本劑主要由腎臟排泄，高齡者因腎功能降低，所以會有血中濃度持續居高現象，應適度減量或將投藥間隔延長，並慎重投予。)
- 本劑之投予會隱蔽胃癌引起的症狀；因此應在確認非惡性後始投予。
- 交互作用
Azole 係抗真菌藥 (Etracozazole) (Azole 係抗真菌藥，是以轉換為鹽酸鹽吸收的，所以與具有酸分泌抑制作用的本劑併用時，吸收性會降低，引起血中濃度降低的報告。)

【副作用】(罕有；0.1% 以下，偶有：0.1%~5%)

(1) 重大副作用：

- ① 休克：罕有，但需充份觀察，有異常情況時，請中止投藥，並採行適當之處置。
- ② 汎血球減少，無顆粒球症：罕有，認有異常狀況時，請中止投予。
- ③ 罕有其他 H₂ 接受體拮抗劑會出現的 Anaphylaxis；間質性腎炎；再生不良性貧；收縮不全等報告。若有以上症狀出現時，需立刻中止投予並採行適當處置。

(2) 其他副作用：

- ① 過敏症：罕有發疹、皮疹、蕁麻疹 (紅斑)。當有這些症狀時，請中止投予。
- ② 血液：罕有血小板減少、嗜酸球增多、偶有白血球減少，認為有異常時請中止投予。
- ③ 消化器：偶有便秘，罕有下痢、軟便、口渴、噁心、嘔吐、腹部膨滿感、食慾不振、口內炎等。
- ④ 循環器：罕有脈搏數減少、頻脈、房室阻滯、血壓上升、顏面潮紅、耳鳴等。
- ⑤ 肝臟：偶有 GOT、GPT、ALP、上升情形，罕有總 Bilirubin、LDH 之上升等。
- ⑥ 精神神經系：罕有全身倦怠、無力感、可逆性錯亂狀態、痙攣、頭痛、頭重感、失眠等。
- ⑦ 內分泌系：罕有月經不順、女性化乳房等，若有此情形，請中止投予。
- ⑧ 其他：罕有顏面浮腫。

【警語】

1. 關於懷孕中投予之安全性尚未確立，孕婦或有可能懷孕的婦人，最好不要投予。而且，由於其會移行到母乳中；因此投予授乳婦時，應注意不要授乳。
2. 對於小兒使用之安全性未確立。

【藥效、藥動】

1. 有胃酸及胃蛋白酶 (Pepsin) 分泌之抑制作用。
2. 0.1~0.2mg/kg 之靜脈內投予，有增加健康正常人之胃粘膜血流量之傾向。
3. 經口投予時，投予後 2~3 小時達到最高血中濃度。自血中之半衰期不論經口或靜脈內投予，皆約 3 小時。
4. 人體經口投予時，尿中之代謝物，只有原型態體及 S-oxide 體而已。S-oxide 體占尿中總排泄量之比例在經口投予為 8.5~17.5%，而靜脈內投予則為 8.0%。
5. 至投予後 24 小時止，原型體之尿中排泄率，在人體經口投予為 35~44% 而靜脈內投予為 88~91%。

【賦形劑】

Cyclocel Mannitol TAG、Microcrystalline Cellulose 301、Croscarmellose Sodium、Magnesium Stearate、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 6cps、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 15cps、Food Yellow No.5(Aluminum-lake)、Talc、Titanium Dioxide、Polyethylene Glycol 6000。

【貯存】25°C 以下避光保存

【包裝】2~1000 錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 043294 號