



"永勝"

秘舒通腸溶錠5毫克(秘可舒)

Bisaton E. C. Tablets 5mg "EVEREST" (Bisacodyl)

本品主成分Bisacodyl為瀉劑，其藥效直接作用於結腸粘膜而引起腸蠕動使糞便軟化而排出。

【成分】：每錠含：

Bisacodyl5mg

【特點】：

Bisacodyl具有瀉劑作用，作用於結腸粘膜，產生蠕動，軟化糞便於排出體外。

【適應症】緩解便秘。

【用法用量】

一日1次，於睡前（或空腹時）服用。成人1次1-3錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。本藥應整粒吞服，不得剝半或嚼碎。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 五、本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

【警語】

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
- 二、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 三、使用期間若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 四、若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
- 五、使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
- 六、使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 七、除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿6歲之嬰幼兒不得使用。
- 八、禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。
- 九、長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
- 十、本藥為腸溶製劑，須整粒吞服，不得咬碎或磨粉，且使用藥前一小時不得使用制酸劑或牛乳。

【賦形劑】：Lactose、Potato Starch、Polyvinyl Pyrrolidone K30、Magnesium Stearate、Talc、Hydroxypropyl Methyl Cellulose Phthalate、Gelatin、Sucrose、Calcium Diphosphate、Tartrazine、Sunset Yellow FCF、Wax。

【保存條件】：儲藏於25℃以下

【包裝】：2-1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

衛署藥製字第039970號



嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話:05-2218686(代表號)